

Relación de procesos analizados. Criterios de inclusión, exclusión y factores agravantes que los definen

1.- Colelitiasis

Criterios de inclusión.

Colelitiasis simple y asintomática con Vía Biliar Principal normal (no existe evidencia científica de indicación quirúrgica).

Colelitiasis con:

- Cólicos biliares.
- Síndrome dispéptico.
- Antecedentes recientes de pancreatitis aguda.
- Antecedente reciente de colecistitis aguda.
- Antecedente reciente de ictericia obstructiva.
- Antecedente reciente de episodio de colangitis.
- Litiasis en la Vía Biliar Principal (VBP) o sospecha de la misma.
- Vesícula en porcelana (alta incidencia de neoplasias)
- Cálculos acompañados de pólipos
- Cálculo único mayor de 3 cm. (mayor frecuencia de neoplasias)

Criterios de exclusión.

- Pacientes en edad pediátrica.
- Presencia actual de: pancreatitis aguda, colecistitis aguda, ictericia obstructiva o colangitis.
- Esferocitosis hereditaria.

Factores Agravantes.

- Diabetes, otras enfermedades inmunodeficitarias o tratamiento inmunodeficitarios prolongados.

2.- Hernia Inguinal primaria o recidivada.

Criterios de inclusión.

- Hernia inguinal primaria.
- Hernia Inguinal recidivada.

Criterios de exclusión.

- Pacientes en edad pediátrica.
- Presencia actual de oclusión intestinal total o parcial.
- Presencia actual de encarceración o estrangulación herniaria.

Factores Agravantes.

- Antecedente reciente de crisis suboclusiva de origen herniario.
- Episodios repetidos de encarceración.
- Dolor que ocasiona limitación funcional considerable.

3.- Hernia crural primaria o recidivada.

Criterios de inclusión.

- Hernia crural primaria .
- Hernia crural recidivada.

Criterios de exclusión.

- Pacientes en edad pediátrica.
- Presencia actual de oclusión intestinal total o parcial.
- Presencia actual de incarceration o estrangulación herniaria.

Factores Agravantes.

- Antecedente reciente de crisis suboclusiva de origen herniario.
- Episodios repetidos de incarceration.
- Dolor que ocasiona limitación funcional considerable.

4.- Sinus Pilonidal

Criterios de inclusión.

- Sinus Pilonidal Primario situado en región sacrococcígea.
- Sinus Pilonidal Recidivado situado en región sacrococcígea.

Criterios de exclusión.

- Pacientes en edad pediátrica.
- Sinus Pilonidal asociado a defectos en el canal raquídeo.
- Sinus Pilonidal no localizado en región sacrococcigea.

Factores Agravantes.

- Episodios frecuentes de abscesificación.
- Diabetes, otras enfermedades inmunodeficitarias y tratamientos prolongados que produzcan inmunodeficiencia.

5.- Hernia Umbilical

Criterios de inclusión.

- Hernia umbilical primaria o recidivada.

Criterios de exclusión.

- Pacientes en edad pediátrica.
- Presencia actual de oclusión intestinal total o parcial o cualquier otro proceso que indique cirugía urgente.
- Embarazo.
- Diálisis peritoneal.

- Hepatopatía crónica con hipertensión portal.

Factores agravantes.

- Crisis suboclusivas de repetición.
- Episodios recidivantes de incarceration.
- Dolor que ocasiona limitación funcional.
- Ulceración de la piel.

6.- Evetraciones Laparotómicas

Criterios de inclusión.

- Eventración laparotómica media, lateral o periférica primaria o recidivada.

Criterios de exclusión.

- Pacientes en edad pediátrica.
- Hepatopatía crónica con hipertensión portal.

Factores agravantes.

- Crisis suboclusivas de repetición.
- Episodios recidivantes de incarceration.
- Dolor que ocasiona limitación funcional.
- Ulceración de la piel.

7.- Hemorroides

Criterios de inclusión.

- Enfermedad hemorroidal de cualquier grado.

Criterios de exclusión.

- Enfermedad inflamatoria intestinal.
- Embarazo.
- Prolapso hemorroidal irreductible agudo.
- Hepatopatía crónica con hipertensión portal.
- Enfermedades mieloproliferativas y agranulocitosis. (xisten lesiones en pacientes con dichas patologías que simulan hemorroides siendo en realidad manifestaciones locales de la infiltración linfomatosa)

Factores agravantes.

- Proctorragia que ocasiona anemización.
- Dolor crónico que ocasiona limitación funcional importante.
- Prolapso hemorroidal crónico (hemorroides grado IV/IV)

8.- Fisura Anal

Criterios de inclusión.

- Pacientes con ulceración del epitelio escamoso del canal anal (Fisura anal).

Criterios de exclusión.

- Fisura anal secundaria de causa fácilmente identificable, (p.e. secundaria a exploraciones endoscópicas, necrosis postrradiación, traumatismos, ETS, etc...).
- Enfermedades inflamatorias intestinales.

Factores agravantes.

- Dolor anal incapacitante.

9.- Fístula Anal

Criterios de inclusión.

- Fístula anal primaria.
- Fístula anal recidivada.

Criterios de exclusión.

- Pacientes en edad pediátrica.
- Enfermedades inflamatorias intestinales.
- Hidrosadenitis supurativa perineal.

Factores agravantes.

- Diabetes mellitus.
- enfermedades inmunodeficitarias.
- Episodios frecuentes de abscesificación.

10.- Lesiones Benignas de la Mama

Criterios de inclusión.

- Lesiones benignas de mama.

Criterios de exclusión.

- Sospecha de malignidad en mayor o menor grado.
- Mastitis relacionadas con la lactancia.

Factores agravantes.

- Infección local (abscesos y fistulas periareolares etc)

11.- Bocio nodular eutiroideo.

Criterios de inclusión.

- Bocio nodular eutiroideo.

Criterios de exclusión.

- Hipertiroidismo.

Factores agravantes.

- Disfonía.
- Dificultad respiratoria por compresión traqueal.

- PAAF con proliferación folicular.
- PAAF con sospecha de malignidad.

12.- Hipertiroidismo

Criterios de inclusión.

- Enfermedad de Graves-Basedow.
- Bocio nodular tóxico.

Criterios de exclusión.

- Ninguno

Factores agravantes.

- Hipertiroidismo de difícil control con tratamiento médico.

Prioridades otorgadas a cada proceso

PA= prioridad alta (< 30 días)

PM= prioridad media (30-90 días)

PB= prioridad baja (> 90 días)

Proceso 1: Colelitiasis con sus diferentes subprocesos.

	Factores de Riesgo NO	Factores de Riesgo SI
1.1 Colelitiasis simple con VBP normal y asintomática.	No existe evidencia científica de indicación quirúrgica.	PB
1.2 Síndrome dispéptico	PB	PB
1.3 Cólicos aislados	PB	PM
1.4 Cólicos de repetición	PM	PA
1.5 Episodio reciente colecistitis aguda	PM	PA
1.6 Episodio reciente pancreatitis aguda	PA	PA
1.7 Litiasis en VBP o sospecha de ella	PA	PA
1.8 Episodio reciente de ictericia obstructiva	PA	PA
1.9 Episodio reciente de colangitis	PA	PA
1.10 Vesícula en Porcelana.	PM	PM
1.11 Cálculos acompañados de pólipos en vesícula	PM	PM
1.12 Cálculo único mayor de 3 cm	PB	PM

	Factores de Riesgo NO	Factores de Riesgo SI
Proceso 2: Hernia inguinal primaria o recidivada	PB	PA
Proceso 3: Hernia crural primaria o recidivada	PB	PA
Proceso 4: Sinus Pilonidal primario o recidivado	PB	PM
Proceso 5: Hernia Umbilical	PB	PA
Proceso 6: Eventración laparotómica	PB	PA
Proceso 7: Enfermedad hemorroidal	PB	PA
Proceso 8: Fisura anal	PM	PA
Proceso 9: Fístula anal	PB	PM
Proceso 10: Lesiones benignas de la mama	PB	PM
Proceso 11: Bocio nodular eutiroideo	PB	PA
Proceso 12: Hipertiroidismo	PM	PA